

Quadro crisi di Serena Quaranta (anno 2011)

01 sabato	5 crisi forti con ipertono, grido forte e pianto	
02 domenica	5 crisi forti con ipertono, grido forte e pianto	Taloxa 1,75 cc. X 2
03 lunedì	6 crisi forti con ipertono, grido forte e pianto	os Daniela
04 martedì	11 crisi forti con ipertono, grido forte e pianto	Micronoan endoretale
05 mercoledì	no crisi	ft Teresa 1° giorno
06 giovedì	no crisi	
07 venerdì	no crisi	
08 sabato	no crisi	
09 domenica	5 piccolissime crisi basate su accenno di ipertono e nistagmo.	
10 lunedì	8 piccole crisi basate su accenno di ipertono e nistagmo si nota aumento int. E numero. No logot.dal 09.12.2010 as oggi fino	
11 martedì	12 crisi forti, hanno ripreso no UTR	Micronoan endoretale
12 mercoledì	no crisi app. dott.ssa Laselva Bari 15.30	Taloxa 1,5 + 1.75 cc
13 giovedì	no crisi	
14 venerdì	2 crisi blande	
15 sabato	7 crisi	
16 domenica	8 crisi Bactrim febbre alta	
17 lunedì	6 crisi	
18 martedì	5 crisi	
19 mercoledì	7 crisi	
20 giovedì	9 crisi	
21 venerdì	4 crisi visita d.tt.ssa Tedesco (pediatra) febbre ancora alta, punte alte	Taloxa 1,75 cc. X 2
22 sabato	6 crisi	
23 domenica	6 crisi	Crotalus 5 g. al di
24 lunedì	5 crisi dopo una sospensione ripresa dell'	Omeprazolo 10 mg.
25 martedì	9 crisi	

26 mercoledì 9 crisi
 27 giovedì 7 crisi
 28 venerdì 10 crisi
 29 sabato 7 crisi
 30 domenica 6 crisi
 31 lunedì 8 crisi

Taloxa 1,75 + 2 cc.

Febbraio 2011

01 martedì 10 crisi muchi e febbri con punte alte 39° inizio **Macladin e Mag 2**

02 mercoledì 11 crisi

03 giovedì 8 crisi ore 10.30 dott.ssa Ronzino; chiamare dott.ssa Laselva

04 venerdì 9 crisi

05 sabato 11 crisi

06 domenica 11 crisi

07 lunedì 16 crisi stop Macladin inizio Glazidim Bentelan 1,5 mg. Al bisogno **febbre ancora**

alta- Catarro

08 martedì 8 crisi per concomitanza cortisone **1,5 x 2 Taloxa; Bentelan a scalare 1,5 mg anche oggi**

09 mercoledì 7 crisi **Bentelan 1,5 mg. A scalare**

10 giovedì 10 crisi **Bentelan 1 mg.**

11 venerdì 6 crisi **Bentelan 1 mg. nelle 24 h.**

12 sabato 8 crisi **Bentelan 1 mg. nelle 24 h.**

13 domenica 11 crisi **Bentelan 0,5 mg nelle 24 h.**

14 lunedì 9 crisi **Bentelan 0,5 mg nelle 24 h.**

15 martedì 6 crisi **Bentelan 0,5 mg nelle 24 h.**

16 mercoledì 5 crisi più leggere, solo ipertono **Bentelan 0,5 mg nelle 24 h. visita dr Francavilla BA**

17 giovedì 3 crisi blande, solo forte ipertono all'inizio no Laura UTR

18 venerdì 4 crisi nella giornata meno forti , no notte. No Michela scuola da oggi **Lucen 10 mg. 1 al di**

19 sabato 3 crisi una ogni pasto principale no crisi nella notte

20 domenica 4 crisi di cui una nella notte
21 lunedì 4 crisi (di cui una nella notte) la terza è di soli 5"
22 martedì 5 crisi, la quinta è più forte delle altre. No crisi notturne
23 mercoledì 6 crisi di cui due forti. No crisi notturne
24 giovedì 1 crisi. No crisi notturne
25 venerdì 5 crisi (3 dopo i pasti e due leggere) . No crisi notturne
26 sabato 4 crisi (2 dopo i pasti ed 1 nella notte)
27 domenica 3 forti crisi (1 dopo cena) . No crisi notturne ma ha pianto molto
28 lunedì 3 crisi dopo i pasti. No Laura, non ha avvisato. Glutine 50%

Stiamo reintroducendo il Glutine dopo la visita fatta il 16.01.2011 dal dottor Francavilla. Sta cominciando a mangiare tutti gli alimenti tranne il lattosio

Marzo 2011

01 martedì 3 crisi forti dopo i pasti

da oggi cura omeopatica completa dott.ssa Chianura per muchi e febbri:

-New era Q 3 granuli x 3

-Crotalus 5 g.

Nux vomica complex 5 g.

-Cicutaplus 5 g.

02 mercoledì 4 crisi (l'ultima a cena molto forte). No crisi notturne

03 giovedì 1 sola crisi. No crisi notturne

04 venerdì 4 crisi . No crisi notturne da oggi aumento al 60% glutine

05 sabato 1 crisi forte e qualcuna che non esce e viene interrotta. No crisi notturne

06 domenica 2 crisi . No crisi notturne

07 lunedì 1 crisi . No crisi notturne

08 martedì ore 12.00 visita dott.ssa Laselva H. San Paolo Bari

09 mercoledì 3 crisi . No crisi notturne

10 giovedì 2 crisi . No crisi notturne

11 venerdì	1 crisi . No crisi notturne	
12 sabato	3 crisi . No crisi notturne	
13 domenica	5 crisi durante il viaggio per Osimo	
14 lunedì	4 crisi forti e.....dorme	ricovero Lega del Filodoro Osimo
15 martedì	3 crisi, dopo colloquio con dott.ssa Laselva si introduce ½ cps Frisium la sera	
16 mercoledì	no crisi forti, solo 2 blande interrotte	
17 giovedì	no crisi, oggi è più reattiva	
18 venerdì	1 crisi al mattino poi diviene gradatamente più reattiva	
19 sabato	3 crisi	Taloxa 1,3 + 1,5 cc.
20 domenica	5 crisi durante il viaggio di ritorno	
21 lunedì	2 crisi	
22 martedì	0 crisi, accenni di nistagmo e basta	Taloxa 1,5 x 2 cc.
23 mercoledì	accenni di crisi interrotti sotto forma di nistagmo o lateralizzazione del capo	
24 giovedì	2 crisi molto forti (1 la mattina all'UTR ed una a scuola dopo pranzo)	Taloxa 1,5 + 1,75 cc.
25 venerdì	2 crisi più forti e qualche accenno di crisi	
26 sabato	0 crisi e qualche accenno	
27 domenica	0 crisi e 4 accenni di crisi	
28 lunedì	3 crisi interrotte, blande	
29 martedì	solo qualche scatto	Taloxa 1,5 x 2
30 mercoledì	solo qualche scatto	
31 giovedì	1° giorno no crisi no scatti	

Aprile 2011

01 venerdì	0 crisi
02 sabato	0 crisi
03 domenica	1 crisi molto forte febbre a 39,7. Diversi accenni di crisi causa febbre (1 mg. Bentelan)
04 lunedì	0 crisi
05 martedì	0 crisi

06 mercoledì 0 crisi
07 giovedì 0 crisi
08 venerdì 0 crisi visita H. San Paolo dott.ssa Laselva. EEG meno critico, si vede che sta meglio
09 sabato 0 crisi
10 domenica 0 crisi
11 lunedì 0 crisi
12 martedì 0 crisi
13 mercoledì 0 crisi appuntamento dott. Tarantino U.I.Ciechi
14 giovedì 0 crisi
15 venerdì 0 crisi 1 lez. Musicoterapia a Taranto
16 sabato 0 crisi
17 domenica 0 crisi
18 lunedì 0 crisi
19 martedì 0 crisi
20 mercoledì 0 crisi
21 giovedì 0 crisi
22 venerdì 0 crisi
23 sabato 0 crisi
24 domenica 0 crisi
25 lunedì 0 crisi
26 martedì 0 crisi
27 mercoledì 0 crisi
28 giovedì 0 crisi
29 venerdì 0 crisi
30 sabato 0 crisi

Maggio 2011

01 domenica 0 crisi

02 lunedì 0 crisi

03 martedì 0 crisi policlinico dott. Francavilla; conferma terapia 10 mg. Lucen al di

04 mercoledì 0 crisi

05 giovedì 0 crisi punta febbrile 39.4 Bentelan 1 mg e dopo 4 ore passa e come se nulla fosse

06 venerdì 0 crisi

07 sabato 0 crisi

08 domenica 0 crisi

09 lunedì 0 crisi

10 martedì 0 crisi

11 mercoledì 0 crisi **punta febbrile 39.7** Bentelan 1 mg e dopo 4 ore passa;accenni di crisi

12 giovedì 0 crisi

13 venerdì 0 crisi

14 sabato 0 crisi

15 domenica 0 crisi

16 lunedì 0 crisi

17 martedì 0 crisi

18 mercoledì 0 crisi **punta febbrile 39.7** Bentelan 1 mg e dopo 4 ore passa;accenni di crisi

19 giovedì 0 crisi visita dr Lozito rimandata al 31

20 venerdì 0 crisi

21 sabato 0 crisi

22 domenica 0 crisi **punta febbrile 39.7** - catarro Bentelan 1 mg e dopo 4 ore passa;accenni di crisi

23 lunedì 0 crisi

24 martedì 0 crisi

25 mercoledì 0 crisi

26 giovedì 0 crisi **ricovero H. Tatarella di Cerignola dr Ratcliff – centro fibrosi cistica**

27 venerdì 0 crisi

28 sabato 0 crisi

29 domenica 0 crisi

30 lunedì 0 crisi

31 martedì 0 crisi visita dr Lozito

Attualmente da quando abbiamo segnato 0 crisi si verificano solo dei nistagmi e lateralizzazione del capo ma non crisi forti. Di contro abbiamo riscontrato una diminuzione del già insufficiente tono muscolare. Comunque è più presente e collaborativa per quanto possibile perché non disturbata dalle crisi. Col capo fa segno di gradire o no i cibi proposti o in risposta finalizzata ad elementari domande poste. Tali affermazioni vengono anche fatte dalla chiusura degli occhi. La negazione viene espressa attraverso il capo da dx a sx e viceversa. Da quando assume il taloxa non riesce ad evacuare da sola e siamo costretti a farla evacuare con il sondino foley o con le perette di acqua. A nulla sono valsi i tentativi con lassativi.

Giugno 2011

01 mercoledì 0 crisi

02 giovedì 0 crisi appuntamento col dr Pignatelli (fisiatra ASL)

03 venerdì 0 crisi

04 sabato 0 crisi

05 domenica 1 crisi con leggero ipertono

06 lunedì 1 crisi con leggero ipertono Pablo Beelen – Tombolini x tutori

07 martedì 1 crisi con leggero ipertono

08 mercoledì 4 crisi con leggero ipertono; telefonato dott.ssa Laselva, aumento **Frisium 5 mg. X 2**

09 giovedì 3 crisi con leggero ipertono

10 venerdì 1 crisi con leggero ipertono

11 sabato 0 crisi

12 domenica 0 crisi

13 lunedì 0 crisi

14 martedì 0 crisi

15 mercoledì 0 crisi

16 giovedì 0 crisi da oggi su indicazione del dr Ratcliff **Lucen 10 mg. 2 volte al di**

17 venerdì 0 crisi

18 sabato 0 crisi

19 domenica 0 crisi

20 lunedì 0 crisi

21 martedì 0 crisi
22 mercoledì 0 crisi
23 giovedì 0 crisi
24 venerdì 0 crisi
25 sabato 0 crisi
26 domenica 0 crisi
27 lunedì 0 crisi
28 martedì 0 crisi
29 mercoledì 0 crisi
30 giovedì 0 crisi

Luglio 2011

01 venerdì 0 crisi
02 sabato 0 crisi
03 domenica 0 crisi
04 lunedì 0 crisi
05 martedì 0 crisi
06 mercoledì 0 crisi
07 giovedì 0 crisi
08 venerdì 0 crisi
09 sabato 5 crisi a grappolo x **la febbre** **febbre a 38.7** Bentelan 1 mg.
10 domenica 2 crisi **febbre a 37.7 e poi a 38,2**
11 lunedì 3 crisi
12 martedì 1 crisi **da oggi x la febbre BIFISELLE (dott.ssa Chianura)**
13 mercoledì 2 crisi blande(5") **da oggi Enterelle (dott.ssa Chianura)**
14 giovedì 2 crisi blande; ha chiamato la dott.ssa Mancardi Tampone orofaringeo positivo quindi Serena deve prendere l'AUGMENTIN per 10 gg.
15 venerdì 0 crisi

16 sabato	3 crisi con grido	
17 domenica	2 crisi con grido	
18 lunedì	3 crisi con grido	fine Enterelle
19 martedì	3 crisi con grido	inizio cura BIFISELLE 1 cps x 2 al di
20 mercoledì	3 crisi con grido	
21 giovedì	3 crisi con grido	
22 venerdì	5 crisi in questo pèriodo le fa tutte col grido.	
23 sabato	3 crisi	
24 domenica	3 crisi	
25 lunedì	4 crisi	
26 martedì	4 crisi	
27 mercoledì	5 crisi	
28 giovedì	3 crisi	ha evacuato da sola
29 venerdì	5 crisi	
30 sabato	3 crisi blande	
31 domenica	2 crisi blande	

Da quando assume il taloxa non riesce ad evacuare da sola e siamo costretti a farla evacuare con il sondino foley o con le perette di acqua. A nulla sono valsi i tentativi con lassativi. L'ultimo in ordine di tempo, l'Onlygol, non ha dato risultati, siamo arrivati ad 1,5 bustine ma nulla di fatto. Richiamerò il dr Ratcliff per avere delle indicazioni.

Agosto 2011

01 lunedì	3 crisi (1 di notte e 2 di giorno)	
02 martedì	1 crisi (01.30) ultimo giorno Bifiselle – revulsione oculare prima e dopo pranzo x 1 ora	
03 mercoledì	3 crisi	
04 giovedì	2 crisi	RAMNOSELLE 2cps x 2 per 6 gg.
05 venerdì	5 crisi	
06 sabato	6 crisi (3 la notte + 3 il giorno) ipertono e rossore, grido ed occhi fissi -pochi secondi ; da oggi yovis 250 1 bustina e Gaviscon ai pasti principali	

07 domenica	2 crisi
08 lunedì	4 crisi
09 martedì	4 crisi
10 mercoledì	5 crisi
11 giovedì	5 crisi
12 venerdì	7 crisi Frisium sempre 3 + 3 +5 mg al di e Taloxa 1,25 + 1,25
13 sabato	8 crisi
14 domenica	3 crisi – OLIO extrav. DI OLIVA la mattina a digiuno da oggi
15 lunedì	5 crisi (2 la notte e 3 la sera) – RAMNOSELLE 1 CPS LA SERA
16 martedì	7 crisi
17 mercoledì	9 crisi a grappolo febbre a 40° siamo andati a Gardaland x Ale e Serena è stata male come previsto. Il caldo era opprimente ed era nervosa ed insofferente. L'abbiamo fatta bere molto ma il caldo era insopportabile. Ne accontenti una ma scontenti l'altra.
18 giovedì	5 crisi
19 venerdì	5 crisi
20 sabato	5 crisi (2 la notte e 3 la sera)
21 domenica	1 crisi
22 lunedì	1 crisi
23 martedì	1 crisi
24 mercoledì	6 crisi
25 giovedì	2 crisi
26 venerdì	1 crisi
27 sabato	5 crisi (3 di notte e 2 di giorno)
28 domenica	3 crisi
29 lunedì	4 crisi
30 martedì	2 crisi

31 mercoledì 2 crisi

Le crisi sono composte in questo modo: all'inizio della crisi grida per il forte spasmo in flessione, manifesta rossore in viso e gli occhi presentano nistagmo e poi fissità venendo strabuzzati leggermente in fuori con maggiore evidenza del bulbo oculare. Presenta trisma e quindi serra la mandibola per pochi secondi. Le crisi Durano pochi secondi .

Settembre 2011

01 giovedì 3 crisi

02 venerdì 4 crisi

03 sabato 3 crisi

04 domenica 3 crisi

05 lunedì 5 crisi presenta **febbre** – **37,3**

06 martedì 5 crisi visita dott.ssa Tedesco **Nurofen x 6 gg. – febbre 37,2 ; ha dei muchi**

07 mercoledì 4 crisi

08 giovedì 4 crisi

09 venerdì 3 crisi – **Ospedale S. Paolo visita dott.ssa Laselva**: bisogna procedere al wash out del Frisium; da oggi 3+3+3 ed attendere istruzioni per il seguito. Dopo il wash out dobbiamo inserire il Mogadon

10 sabato 6 crisi

11 domenica 2 crisi

12 lunedì 4 crisi

13 martedì 4 crisi

14 mercoledì 5 crisi

15 giovedì 7 crisi un po' più forti come ipertono ed altre manifestazioni descritte il 31 agosto

16 venerdì 4 crisi leggermente meno forti di ieri; è più assopita del solito. (Massimo corso

Di UNIAMO sull'empowerment – malattie rare a Milano oggi e domani).

17 sabato 4 crisi come al solito – appare più reattiva, ha sorriso di più ed ha risposto di più alle Stimolazioni -

18 domenica 6 crisi (1 alle 03.00 ed una alle 07,30) brutta giornata e brutte crisi, l'ipertono è più forte.

INDICAZIONI DA SEGUIRE PER MIGLIORARE LA FUNZIONALITA' INTESTINALE

1. La mattina 1 cucchiaino di Olio a digiuno + acqua
2. verdura fresca (cuore di lattuga) o cotta sminuzzata ai pasti;
3. noci alternate a mandorle e olive per gli acidi grassi;
4. frutta, soprattutto kiwi a merenda MATTINA E POMERIGGIO;
5. decremento frisium 3mgx3 dal 09.09.2011 al 23.09.2011 da indicazioni della dott.ssa Laselva
6. decremento frisium 3mgx2 dal 24.09.2011 al 08.10.2011
7. decremento frisium 3mgx1 dal 09.10.2011 al 24.10.2011
8. Taloxa sempre fermo a 1,25 cc.x2

18 settembre 2011

- 19 lunedì 2 crisi oggi è stata meglio, l'abbiamo fatto evacuare in mattinata. E' stata reattiva E
- 20 martedì 3 crisi da stanotte Serena ha la **febbre, prima a 37.3 poi 37,8 dato nurofen.** N.E.
Nel pomeriggio ed in serata non ha avuto febbre.
Ho telefonato in mattinata al dr Ratcliff ed ha dato le seguenti disposizioni:
1. Onlygol ricominciare ed andare oltre le 2 bustine al di aumentare fini all'evacuazione.
2. Flumucil 1 fiala al di x os
- 21 mercoledì 5 crisi di cui 3 abbastanza forti e 2 blande) Ha evacuato al mattino col sondino
- 22 giovedì **da oggi iniziare con il Benadon ½ (Laselva) fiala per 1 mese, poi 0,75**
- 23 venerdì 8 crisi
- 24 sabato 5 crisi 3 mg. Di frisium per 2
- 25 domenica 7 crisi
- 26 lunedì 4 crisi Ho telefonato alla dottoressa Laselva, ha detto di accelerare il wash out del frisium
Da domani mattina 3 mg. Al mattino per 3 gg. E poi dopo 3 gg. Nulla;

aspettare 2 giorni ed inserire ¼ di cps da 5 mg. Di **Mogadon** al mattino.

27 martedì 3 crisi ritiro referto dall'ospedale
28 mercoledì 1 crisi oggi risulta più reattiva
29 giovedì 2 crisi anche oggi è reattiva, ride e canta **ultima dose di Frisium**
30 venerdì 10 crisi oggi..... in serata si decide di aumentare la protezione gastrica; Lucen 10 mg da
Stasera; quindi la terapia diventa 10 mg. X 2

Ottobre 2011

01 sabato 4 crisi
02 domenica 5 crisi
03 lunedì 4 crisi
04 martedì 5 crisi
05 mercoledì 4 crisi
06 giovedì 4 crisi INSERIMENTO ¼ di cps di **Mogadon** al mattino; inserimento Benadon 1 ml.
07 venerdì 3 crisi (1 la notte, nei giorni scorsi non è stato specificato))
08 sabato 2 crisi (1 la notte)
09 domenica 1 crisi + 1 interrotta con pressione sotto il nasino (no crisi notturne)
10 lunedì 3 crisi (no crisi notturne)
11 martedì 2 crisi durante il pomeriggio (no crisi notturne)
12 mercoledì 1 crisi e 3 interrotte con la solita pressione sotto il nasino, sono crisi che non escono. (no
crisi notturne)
13 giovedì 5 crisi (2 la notte) **AUMENTO MOGADON ¼ x 2 al di**
14 venerdì 6 crisi
15sabato 1 crisi
16 domenica 2 crisi
17 lunedì 3 crisi (febbre 37,2)
16 martedì 1 crisi dorme dal mattino senza fare colazione fino alle 16,30. Ha anche saltato il pranzo.

Le abbiamo dato la pappa reale mattino e pranzo.

19 mercoledì 4 crisi Ho telefonato alla dott.ssa Laselva,mi chiamerà lei

20 giovedì 8 crisi (2 la notte, 3 la mattina e 3 il pomeriggio)

21 Venerdì 5 crisi tutte di mattina entro le 15.00 (no crisi notturne).

22 Sabato 1 crisi alle 01,30 ed 1 alle 11 blanda; alle 06.00 per i muchi con la tosse ha rigurgitato
muchì e un po' di latte della sera (era tardi ed ha mangiato latte e biscotti)

Dal mese di agosto, precisamente dalla metà le crisi sono diventate un po' più forti e quindi abbiamo proceduto al cambio del farmaco. Con il Mogadon si è verificato un **aumento della produzione catarrale** che non essendo espulsa rende più difficile l'assunzione del pasto ed un po' anche la normale respirazione. Infatti molto spesso capita di doverla girare per cambiare la posizione soprattutto quando dorme perché diventa rumorosa e ronfante. Le morfologia delle crisi non si discosta molto è solo più intensa e presenta il pianto. La durata è però un po' maggiore rispetto al frisium. Quando il frisium funzionava aveva solo cenni di crisi e riscontri attraverso nistagmo o lateralizzazione del capo ma era assente l'ipertono. Quando ha cominciato ad assuefarsi è comparso il trisma e l'ipertono con un forte grido causa lo spasmo addominale. Col Mogadon la situazione non è migliorativa per quanto detto in precedenza. Maggiore ipertono, maggiore durata, pianto, scossette.

23 domenica 6 crisi (2 la notte forti- durata sui 6' in toto)

24 lunedì 4 crisi non grida durante l'ipertono ma piange dopo per qualche secondo. da oggi
reinserito Gaviscon 1 cucchiaino ai pasti principali.

25 martedì 5 crisi (1 la notte molto forte) assente il grido durante l'ipertono. No pianto

26 mercoledì 6 crisi (2 la notte, 1 il pomeriggio e 3 la sera; la quinta presenta mioclonie, le altre sono
di media intensità

27 giovedì 4 crisi di media intensità (scala di valore 7), dopo la fase tonica piange un po'.

28 venerdì 3 crisi la sera a grappolo E' molto reattiva durante tutto il giorno, sembra che voglia
Parlare. Ho parlato con la dott.ssa Laselva, visto la situazione stazionaria non si
Procede al momento con altri cambiamenti. Permane:

- 1,25 cc. Taloxa x 2 e ¼ x 2
- Mogadon .
- Il Lucen 10 mg. X 2;
- il Benadon 1 ml al di;
- Gaviscon 1 cucchiaino x 3.

29 sabato 5 crisi (delle quali 3 dalle 06.00 alle 07.20, la notte ha dormito)

da stasera 1 ml. Benadon la sera x 1 mese. Sono le 11.25, Serena è in stato soporoso, ha mangiato pochissimo (le ho dato la pappa reale) . E' venuta la pediatra dott.ssa Tedesco ed ha detto di fare la soluzione ipertonica con il clenil in quanto c'è del **catarro** Nelle vie respiratorie alte. Abbiamo cercato di svegliarla ma era in stato "semicomatoso" e non reagiva a nessuna sollecitazione anche dolorosa. Verso le 15.00. Ha mangiato ¼ della porzione di pranzo e si è riaddormentata. Si è svegliata alle 16.30 ed è stata tranquilla. Sono le 19.00 ed è sempre tranquilla, ha il viso disteso.

30 domenica 3 crisi (2 la notte) giornata più tranquilla rispetto a ieri.

31 lunedì 1 crisi (la sera alle 23.30) è stata bene tutta la giornata, solo qualche nistagmo.

(Venerdì 28 ho parlato con la dottoressa Laselva ed abbiamo deciso di mantenere inalterato il dosaggio vista la stazionaria situazione). Negli ultimi 2 giorni si evidenziano miglioramenti, speriamo che si stabilizzi in meglio la situazione. Ieri ho fatto una e mail alla dottoressa Mancardi, mi ha risposto oggi e le ho inviato una e mail esplicativa con i dosaggi.

NOVEMBRE 2011

01 martedì 1 crisi + 2 accenni (stanotte alle 01.30) fino alle 03.00 è stata sveglia ed eccessivamente reattiva. Durante il giorno solo qualche scatto. E' più tonica sul busto. Cerca di comunicare. E' comunque più reattiva.

02 mercoledì 0 crisi, solo qualche scatto. **Ha evacuato quasi da sola, solo con un leggero massaggio al Pancino.**

03 giovedì 1 crisi (subito dopo la mezzanotte) + 2 accenni durante il giorno. **Ha evacuato da sola a Scuola.** E' molto reattiva.

04 venerdì 2 crisi forti + 2 accenni. E' molto reattiva.

05 sabato 6 crisi (4 forti e 2 più blande, no crisi notturne) la durata delle crisi è di circa 6'.

Iniziano con grido ed Ipertono, elevazione delle braccia verso l'alto e lateralmente, grimaces facciali, trisma e poi contrazioni tonico cloniche che durano alcuni minuti . Abbiamo somministrato una supposta di tachipirina alle 23.30 per stemperare le crisi.

- 06 domenica 7 crisi (5 forti e 2 più blande) 1 subito dopo la mezzanotte 12.05 molto forte come quella descritta prima, poi ha dormito, la notte è passata tranquilla ed ha dormito bene. Alle 08.05 ha avuto una forte crisi come la precedente . La giornata è stata difficile ed alla settima abbiamo utilizzato il **MICROPAM** endorettale. Alle 11.30 sperando che le crisi cedessero abbiamo somministrato 1 supposta di tachipirina. Alle 13.00 comunque ha mangiato molto e con appetito.
- 07 lunedì 7 crisi che però sono più blande, ha avuto solo irrigidimento agli arti, nistagmo e clonie per qualche minuto. No crisi notturne. Ho chiamato la dottoressa Laselva. **Cambio terapia: interrompere MOGADON ed inserire Frisium 5 mg. Da stasera. Taloxa fermo**
- 08 martedì 3 crisi (tutte tra il pomeriggio e la sera)
- 09 mercoledì 3 crisi abbastanza forti
- 10 giovedì 3 crisi forti (ipertono, chiazze in viso, grimaces, trisma e clonie e prolungamento dello stato di contrazione a contrazione , dell'intensità e della durata della crisi oltre tutto il resto. Viene svegliata dalle crisi).
A causa della forte intensità delle crisi ho parlato con la dottoressa Laselva e mi ha detto di inserire il **Frisium anche la mattina con 3 mg**, aspettare fino a lunedì 14 novembre e chiamarla per vedere il da farsi.
TERAPIA COMPLETA: Lucen; Taloxa 1,25 cc x 2; Frisium 3 mg+ 5 mg.;
- 11 venerdì 7 crisi (5 forti + 2 meno forti) ultimo giorno **Benadon** fino alle 15.52.
Nella notte nessuna crisi, ha dormito bene
- 12 sabato 5 crisi forti
- 13 domenica 2 crisi forti + alcuni spasmi o irrigidimenti che durano pochissimo
- 14 lunedì 0 crisi. Solo alcuni spasmi, nistagmi o irrigidimenti che durano poco. Giornata positiva.
- 15 martedì 2 crisi abbastanza forti. A musicoterapiadorme e non lavora.
- 16 mercoledì 2 crisi forti con grido ed interessamento dei muscoli del volto in contrazione.
- 17 giovedì 0 crisi. Oggi solo alcuni spasmi, nistagmi o irrigidimenti che durano poco. Dorme molto.
- 18 venerdì 0 crisi, solo qualche spasmo ma è molto reattiva, sembra voglia parlare.
- 19 sabato 0 crisi, la sera ha fastidi con i muchi e la notte ha sonno disturbato perché a causa di

essi non respira bene.

- 20 domenica 0 crisi, la sera ha fastidi con il catarro. **Febbre a 39°**, alle 05.00 si lamenta e le diamo il Bentelan 1 mg. Abbiamo dedotto che le febbri improvvise sono provocate dal deposito di catarro provocato dal Frisium che non riesce ad espellere
- 21 lunedì 0 crisi, qualche irrigidimento di poca durata.
- 22 martedì 0 crisi, qualche irrigidimento di poca durata. Visita da Pablo, è molto reattiva.
- 23 mercoledì 0 crisi, qualche irrigidimento di poca durata. Visita da Pablo, è più reattiva di ieri.
- 24 giovedì 3 crisi molto forti con spasmo forte e grido. Inizio Chelidonium 5 g. x disintossicare il fegato. Ha alitosi.
- 25 venerdì 2 crisi molto forti con spasmo forte e grido. Dorme dalle 14.00 alle 20.00.
- 26 sabato 0 crisi, giornata molto positiva.
- 27 domenica 1 crisi lunga e forte alle 22.30, durante il giorno è stata bene.
- 28 lunedì 1 crisi leggera al mattino, è stata bene durante il giorno, verso sera qualche accenno blandissimo di crisi
- 29 martedì 1 crisi la sera perché ha **febbre a 39°**, Bentelan 1 mg.
- 30 mercoledì 1 crisi forte la sera, durante il giorno solo qualche scatto e nistagmo, rari gli irrigidimenti.

Dicembre 2011

- 01 giovedì 1 crisi forte la sera, durante il giorno solo qualche scatto e nistagmo, è attiva.
- 02 venerdì 2 crisi forti la sera, sta bene durante il giorno; solo qualche scatto e nistagmo, poco appetito.
- 03 sabato 3 crisi (2 forti ed 1 meno forte) la sera, no crisi durante il giorno.
- 04 domenica 1 crisi forte la sera (22.15), con grido forte. **Febbre al mattino 38,6°** (Bentelan 1 mg.)
- 05 lunedì 1 crisi forte la sera con solito grido e forte spasmo. Dura 6'
- 06 martedì 1 crisi forte la sera dopo cena con solito grido e forte spasmo. Dura 7' con il post crisi.
- 07 mercoledì 2 crisi forti verso sera (23.00) con le stesse modalità di questo periodo.
- 08 giovedì 2 crisi forti durante la notte con le stesse modalità di questo periodo. No crisi durante il di.
- 09 venerdì 2 crisi di cui 1 molto forte verso sera, durante il giorno diversi scatti.

10 sabato 3 crisi, (1 la notte, 1 il pom. ed 1 la sera alle 23.00)

11 domenica 2 crisi (1 la notte alle 02,45 ed una la sera verso le 23.00). Scatti durante il giorno.

12 lunedì 0 crisi, giornata buona.

13 martedì 0 crisi, giornata più che buona .

14 mercoledì 0 crisi, giornata buona.

15 giovedì 0 crisi, giornata buona.

16 venerdì 0 crisi, giornata buona.

17 sabato 0 crisi, giornata buona.

18 domenica 0 crisi ma una serie di scatti ed irrigidimenti, è iper sensibile

19 lunedì 8 crisi forti di cui 6 molto forti a grappolo; giornata triste. Sta male. La sera non l'abbiamo fatta mangiare, dorme.

20 martedì 2 crisi forti , e qualche scatto o irrigidimento e nistagmo. I dosaggi sono sempre : Taloxa 1,25 cc x 2;; Frisium 5 mg. La sera e 3 mg. Al mattino; al mattino Lucen 10 mg. E Dopo i pasti principali Maalox 1 cucchiaio.

21 mercoledì 0 crisi, solo qualche scatto o irrigidimento e nistagmo

22 giovedì 0 crisi, solo qualche scatto o irrigidimento e nistagmo

23 venerdì 0 crisi, solo qualche scatto o irrigidimento e nistagmo

24 sabato 1 crisi forte che preavvisa la febbre dalle 20.30 febbre a 38,3 Bentelan la febbre non scende, anzi aumenta fino alle 01.30 poi scende.

25 domenica no crisi .**febbre a 38,5** dalle 07.45 Bentelan – Macladin antibiotico e aerosol sol. Fis. E clenil.
Sfebbra nel pomeriggio ma ha molto catarro e respira male.

26 lunedì 0 crisi . nella notte ha avuto molto catarro – Macladin antibiotico

27 martedì 0 crisi, solo qualche scatto o irrigidimento e nistagmo

28 mercoledì 0 crisi, solo qualche scatto o irrigidimento e nistagmo

29 giovedì 0 crisi, solo qualche scatto o irrigidimento e nistagmo

30 venerdì 0 crisi, solo qualche scatto o irrigidimento e nistagmo

31sabato 0 crisi, solo qualche scatto o irrigidimento e nistagmo